


Stuhl-Karte

Neonatale Cholestase Screening



Sehr geehrte Eltern,
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Nachwuchs.
Gerade in den ersten Lebenswochen ist es
wichtig, dass Sie die Stuhlfarbe Ihres
Neugeborenen beobachten. Falls die Stuhlfarbe
den Bildern 5-7 gleicht (entfärbte Stühle),
sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden.
Die Stuhlkarte sollten Sie zur U3-Untersuchung
bei Ihrem Kinderarzt besprechen.

Dear Parents,
Congratulations on your offspring. Especially in
the first weeks of life, it is important that you
observe the stool color of your newborn. If the
stool color equals images 5-7 (discolored stools),
further tests should be carried out. The stool card
should be discussed in the U3-examination with
your pediatrician.

→ **Kindergastroenterologie
Liver-Unit**

Mit freundlicher Unterstützung der



Medizinische Hochschule
Hannover



Techniker
Krankenkasse

In den ersten Tagen nach der Geburt hat fast jedes zweite Neugeborene eine mehr oder weniger gelbliche Hautfarbe. Diese Gelbfärbung (Ikterus) der Haut, die gelegentlich auch auf der Bindegewebe der Augen auftritt, bildet sich normalerweise innerhalb von zwei Wochen zurück. Man spricht dann von einer „vorübergehenden (passageren) Gelbsucht“ des Neugeborenen (Ikterus neonatorum). In Ausnahmefällen kann diese Gelbsucht aber auch das erste Symptom für eine schwerwiegende Erkrankung sein, sodass rechtzeitig mit einer weiterführenden Diagnostik begonnen werden sollte.



In the first days of life almost every second newborn has a more or less yellowish color. This yellowing (jaundice) of the skin, sometimes it also includes the conjunctiva, usually regresses within two weeks. This is called a "temporary (transient) jaundice" of the newborn (icterus neonatorum). In exceptional cases this jaundice can also be the first symptom of a serious medical condition, so that further diagnostics should be started in time.



Dogumdan sonra ilk günlerde her iki bebekten biri cilt ve göz sarılığı belirtisi gösterir. Genelde bu sarılık hastalık değeri tasımaz ve sonraki günlerde geriler. Bu gerileme halinde bebekte "gecici sarılıktan" bahsedilebilir. Ancak bazı istisnayı durumlarda bu sarılık daha ciddi bir hastalığın beriltilisi de olabilir, bu nedenle her ihtimale karşı ileri tetkiklerin yapılması önerilir. Olası ciddi bir tehsihse erken müdahale edilmesi önem tasır.



В первые дни после рождения каждый второй новорождённый имеет более или менее желтоватый цвет. Это пожелтение на коже (Желтуха), что иногда происходит и на соединительной оболочке глаз, обычно проходит в течении двух недель. Это называется „временной (переходной) Желтухой“ новорожденных. В исключительных случаях такое пожелтение на коже, также может быть первым симптомом серьёзного заболевания, и нуждается в дальнейшей диагностики.



يصاب تقريباً طفل من كل طفلين في الأيام الأولى بعد الولادة باصفرار في الجلد (أو ما يسمى اليرقان). هذا اليرقان - والذي قد يظهر أيضاً في بعض الأحيان في ملتحمة العين - يختفي تدريجياً خلال أسبوعين. يُطلق عليه حينها "اليرقان الوليدي المؤقت أو يرقان حديثي الولادة المؤقت". في بعض الحالات الإستثنائية قد يشير هذا اليرقان إلى وجود مرض خطير، عندها يلزم البدء في إجراء بعض الفحوصات الطبية في الوقت المناسب.

